

INDICACIONES PARA LA PREPARACIÓN PREVIA

• Antígeno de *Helicobacter pylori* en Materia Fecal

Preparación previa

Preparación para diagnóstico

Deberá suspender 2 semanas antes de la recolección de la materia fecal toda medicación que contenga bismuto, antibióticos y antiácidos.

Preparación post tratamiento de erradicación

La muestra se debe recolectar como mínimo 4 semanas después de terminar el tratamiento y la suspensión de la medicación mencionada en el ítem anterior.

Consulte a su médico si tiene dudas con respecto a la discontinuación del tratamiento.

Recolección de la muestra

Recolectar en un frasco plástico, adquirido en la farmacia, un poco de materia fecal, de una deposición aislada de cualquier momento del día (aproximadamente del tamaño de una nuez). Asegurarse de tapar bien el frasco. El frasco sólo debe contener materia fecal, NO agregar ninguna sustancia.

Precauciones al recolectar la muestra:

- ✓ Evitar el contacto de la materia fecal con agua del inodoro y con orina.
- ✓ En personas que utilizan pañal, NO raspar el pañal.
- ✓ El día de la recolección, evitar la utilización de cremas, aceites, ungüentos y/o talco.

Conservación de la muestra

Importante: conservar la muestra en la heladera y remitir al laboratorio dentro de las 24 horas de su recolección.

Entrega de la muestra

Coloque nombre, apellido y DNI al frasco que contiene la muestra. Lleve el recipiente al laboratorio en los horarios indicados al pie de la página para recepción de muestras.

Horarios de extracción y recepción de muestras

- Lunes a Viernes de 7:10 hs a 15:00 hs • Sábados de 8:10 hs a 12:00 hs

Solicitud de resultados

- Para retirar los resultados presentar el ticket que le entregan en recepción o D.N.I
- Los resultados estarán disponibles en el Portal WEB del Sanatorio Allende (www.sanatorioallende.com – Portal paciente)



Para extracción de sangre

RESPETE EL AYUNO INDICADO

24 hs ANTES

Evite realizar actividad física
Evite la ingesta de alcohol

EL DÍA DE LA TOMA DE MUESTRA

Evite el estrés 15 minutos antes de la toma de la muestra

Evite la ingesta de medicamentos, a menos que sea indispensable

Evite tomar té, café o bebidas energizantes

No fume