

INDICACIONES PARA LA PREPARACIÓN PREVIA

• *Prueba de Supresión de Cortisol con Dexametasona*

La prueba consiste en la medición de **Cortisol AM (matinal)** en una muestra basal y otra post-administración de dexametasona (Decadrón). Eventualmente el médico podrá solicitar solamente la realización de cortisol post-dexametasona.

Ayuno: 8 horas.

Procedimiento

Cortisol AM (matinal) basal y post-dexametasona

El primer día: deberá concurrir al laboratorio entre las 7:00 hs y las 9:00 hs para realizarse la extracción de sangre basal. Ese mismo día a las 23.00 hs tomará la dexametasona (Decadrón), que comprará en la farmacia con receta médica y en la dosis indicada por su médico.

El segundo día (es decir al día siguiente): deberá concurrir nuevamente al laboratorio entre las 7:00 hs y las 9:00 hs para una segunda extracción de sangre (post-dexametasona).

Si el médico solicita solo Cortisol post-dexametasona

El primer día: a las 23.00 hs tomará la dexametasona (Decadrón), que comprará en la farmacia con receta médica y en la dosis indicada por su médico.

El segundo día (es decir al día siguiente): deberá concurrir al laboratorio entre las 7:00 hs y las 9:00 hs para la extracción de sangre (post-dexametasona).

Horarios de extracción y recepción de muestras

- Lunes a Viernes de 7:10 hs a 15:00 hs • Sábados de 8:10 hs a 12:00 hs

Solicitud de resultados

- Para retirar los resultados presentar el ticket que le entregan en recepción o D.N.I
- Los resultados estarán disponibles en el Portal WEB del Sanatorio Allende (www.sanatorioallende.com – Portal paciente)



Para extracción de sangre

RESPETE EL AYUNO INDICADO

24 hs ANTES

Evite realizar actividad física
Evite la ingesta de alcohol

EL DÍA DE LA TOMA DE
MUESTRA

Evite el estrés 15 minutos antes de
la toma de la muestra

Evite la ingesta de medicamentos,
a menos que sea indispensable

Evite tomar té, café o bebidas
energizantes

No fume