

INDICACIONES PARA LA PREPARACIÓN PREVIA

• *Antígeno de Galactomanano*

MUESTRA

- ✓ **Suero** (mínimo: 700 uL): ayuno de 8 horas, se debe obtener en tubo con gel para suero o tubo plástico estéril (o tubo nuevo). NO destapar el tubo. NO fraccionar el suero en Eppendorf o copita, dejarlo en el recipiente primario.
- ✓ **Lavado broncoalveolar (LBA) o mini LBA** (mínimo 2,5 mL): se debe recolectar en frasco estéril, de plástico (como los de orina) o de vidrio, sin ningún agregado ni anticoagulante, colocar correctamente la tapa, NO destapar el frasco.

No se realiza la determinación en LCR.

CONSERVACIÓN

- ✓ Suero: entre 2-8°C hasta 5 días, por más tiempo a -20°C.
- ✓ LBA o mini LBA: entre 2-8°C hasta 72 hs, no congelar.



Para extracción de sangre

RESPETE EL AYUNO INDICADO

24 hs ANTES

Evite realizar actividad física

Evite la ingesta de alcohol

EL DÍA DE LA TOMA DE MUESTRA

Evite el estrés 15 minutos antes de la toma de la muestra

Evite la ingesta de medicamentos, a menos que sea indispensable

Evite tomar té, café o bebidas energizantes

No fume

Horarios de extracción y recepción de muestras

- Lunes a Viernes de 7:10 hs a 15:00 hs
- Sábados de 8:10 hs a 12:00 hs

Solicitud de resultados

- Para retirar los resultados presentar el ticket que le entregan en recepción y D.N.I
- Los resultados estarán disponibles en el Portal WEB del Sanatorio Allende (www.sanatorioallende.com – Portal paciente)